



Bezirksverband Charlottenburg der Kleingärtner e.V.  
Ruhwaldweg 1 in 14050 Berlin-Charlottenburg

## Gartenfachberatung im März

- Die im Winter abgestellte Wasserleitungen auf Rohrschäden überprüfen und Frostschutzmaterial an Zapfstellen entfernen.
- Im März beginnt die Pflanzzeit für Bäume und Sträucher.
- Aussaaten im Frühbeet bei frostfreiem Wetter lüften (Vorbeugung gegen Verpilzung).
- Anfang März Frühkartoffeln zum Vorkeimen in flachen Kisten bei 10 - 15° C auslegen.
- Ab Ende März können Blumenkohl, Kopfkohl und Kohlrabi für die Sommer- und Herbsternte auf einem Freilandbeet ausgesät werden.
- In den März fallen die Hauptsaatzeiten für frühe und mittelfrühe Möhrensorten.
- Salatpflanzen für die Sommerernte müssen spätestens bis Ende März ausgesät sein.
- Petersilie sollte nicht vor Mitte März ausgesät werden. Sie benötigt warme, vollsonnige geschützte Beetbereiche.
- Bei günstigen Wetterbedingungen Aussaat von Rettich möglich. Reihenabstand 15-20 cm.
- Rhabarber in den ersten Märztagen pflanzen, Abstand 1 x 1m. Vorhandene Pflanzen mit Stickstoff düngen. Rhabarber ist ein „Starkzehrer“. Düngegabe : 15-20g Volldünger/ m<sup>2</sup>.
- Obwohl Schnittlauch keine besonderen Ansprüche stellt, wächst er in sandigen Lehmböden mit hohem Humusgehalt am Besten.
- Spargel pflanzt man von Mitte März bis Mitte April. Bei uns ist Grünspargel einfacher und besser zu ziehen. Er stellt nicht so hohe Ansprüche an den Boden. Zweijährige Spargelanlagen erhalten im März vor dem Auflaufen eine Stickstoffdüngung. Düngergabe : 15g Volldünger/m<sup>2</sup> sowie Natronsalpeter oder auch schwefelsaures Ammoniak ( Stalldüng ).
- Steckzwiebeln müssen im März gesteckt werden Reihenabstand 25cm
- Mitte bis Ende März kann Knoblauch gesteckt werden .
- Erdbeeren säubern , lockern und düngen. Düngergabe: bis 30g/m<sup>2</sup>
- Johannisbeeren auf Gallmilbenbefall prüfen. Die ballonartig aufgetriebenen Rundknospen sind leicht zu erkennen.